

**Card de atenționare pentru pacienți
Emtricitabină/Tenofovir disoproxil - Indicația Profilaxie ante-expunere**

Vi s-a prescris emtricitabină/tenofovir disoproxil pentru profilaxia ante-expunere pentru reducerea riscului de infecție cu virusul imunodeficienței umane (HIV-1). Pentru ca acest medicament să fie eficace, este important să nu omiteți dozele. Doza recomandată este de un comprimat de emtricitabină/tenofovir disoproxil în fiecare zi. Luați emtricitabină/tenofovir disoproxil exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră.

Ori de câte ori este posibil, emtricitabină/tenofovir disoproxil trebuie administrat împreună cu alimentele.

Pentru a vă ajuta să vă amintiți să luați emtricitabină/tenofovir disoproxil:

- Este util ca administrarea medicamentului să devină parte din rutina dumneavoastră, de exemplu să fie administrat la prânz sau când vă spălați pe dinți după micul dejun. Este important să găsiți un moment care funcționează pentru dumneavoastră.
- Puteți adăuga o notificare zilnică pe telefonul mobil sau pe orice alt dispozitiv care vă poate alerta când este timpul să luați emtricitabină/tenofovir disoproxil în fiecare zi.
- De asemenea, puteți folosi un organizator de medicamente (o cutie mică săptămânală pentru pastile) în care puteți pune comprimatele necesare pentru fiecare săptămână.
- De asemenea, s-ar putea să vă fie util să folosiți calendarul pentru a bifa fiecare zi în care v-ați administrat emtricitabină/tenofovir disoproxil. Începând cu prima săptămână de tratament, bifați ziua în care ați început administrarea medicamentului emtricitabină/tenofovir disoproxil, apoi bifați căsuța corespunzătoare în fiecare zi după administrarea medicamentului emtricitabină/tenofovir disoproxil. De asemenea, puteți nota data la care ați luat primul comprimat de emtricitabină/tenofovir disoproxil dintr-un flacon nou. Dacă nu sunteți sigur dacă ați luat comprimatul, puteți verifica numărul de comprimate rămase în flacon (fiecare flacon nou conține 30 comprimate)

	Dum	Luni	Mar	Mier	Joi	Vin	Samb
Săpt 1							
Săpt 2							
Săpt 3							
Săpt 4							
Săpt 5							
Săpt 6							

Dacă utilizați deja un calendar pe telefon sau pe computerul personal (PC), puteți adăuga o notificare zilnică pentru administrarea de emtricitabină/tenofovir disoproxil

DATA LA CARE AȚI LUAT PRIMUL COMPRIMAT DE
EMTRICITABINĂ/TENOFOVIR DISOPROXIL DINTR-UN FLACON NOU
(ZI/LUNĂ/AN): ____/____/____

REMINDER PROGRAMARE

Următoarea programare la clinică este: _____
Programare: _____

Data: _____

Oră: _____

Loc: _____

Este important să raportați orice reacție adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentului EMTRICITABINĂ/TENOFOVIR DISOPROXIL TILLOMED, către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (www.anm.ro), la secțiunea Medicamente de uz uman/Raportează o reacție adversă.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: adr@anm.ro

Website: www.anm.ro

Raportare online: <https://adr.anm.ro>

www.anm.ro

Sau

Contactați

Departamentul de farmacovigilență al Deținătorului de Autorizație de Punere pe Piață

Tel: +44 (0) 1480 402400

Email: PVUK@tillomed.com